

THÔNG TIN THUỐC

Kháng sinh nhóm quinolon và fluoroquinolon

Kính gửi:

- Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang;
- Ban Chủ nhiệm các khoa/phòng.

Căn cứ Công văn số 5785/QLD-ĐK ngày 24/05/2021 của Bộ Y tế - Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon;

Căn cứ Công văn số 1259/SYT-NVD ngày 25/05/2021 của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon;

Đơn vị Thông tin thuốc – Dược lâm sàng Bệnh viện cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm Quinolon, fluoroquinolon như sau:

TT	CÁC NGUY CƠ	ĐƯỜNG DÙNG	YÊU CẦU	ĐỐI TƯỢNG	TÁC HẠI
1	Hạ đường huyết nghiêm trọng và ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần.	Uống hoặc Tiêm truyền	Thông tin về các tác dụng bất lợi cần được thể hiện nổi bật hơn trên nhãn thuốc và nội dung cần nhất quán giữa các thuốc trong nhóm.	- Người cao tuổi. - Bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị bằng thuốc hoặc insulin.	- Hạ đường huyết nghiêm trọng: có thể gây hôn mê và đe dọa tính mạng. - Ảnh hưởng bất lợi lên sức khỏe tâm thần.
2	Tác dụng bất lợi nghiêm trọng, gây tàn tật và không hồi phục.	Uống, tiêm truyền hoặc hít	Không sử dụng kháng sinh Fluoroquinolon	- Điều trị nhiễm khuẩn có thể cải thiện mà không cần điều trị hoặc các nhiễm khuẩn không nghiêm trọng; - Điều trị các nhiễm trùng không do vi khuẩn như viêm tuyến tiền liệt không do vi khuẩn (mạn tính); - Dự phòng tiêu chảy khi đi du lịch hoặc nhiễm khuẩn đường	Tác dụng bất lợi nghiêm trọng, gây tàn tật và không hồi phục.

TT	CÁC NGUY CƠ	ĐƯỜNG DÙNG	YÊU CẦU	ĐỐI TƯỢNG	TÁC HẠI
				niệu dưới tái phát; - Điều trị các nhiễm khuẩn từ nhẹ đến trung bình nặng trừ khi các kháng sinh được khuyến cáo phổ biến khác không sử dụng được.	
			Tránh sử dụng các kháng sinh Fluoroquinolon	- Bệnh nhân có tiền sử dụng bất lợi nghiêm trọng với fluoroquinolon hoặc quinolon. - Người cao tuổi, bệnh nhân có bệnh thận, bệnh nhân đã ghép tạng hoặc người được điều trị bằng corticosteroid.	Nguy cơ cao tổn thương gân.
3	<i>Đứt hoặc rách động mạch chủ</i>	Uống hoặc tiêm truyền	Không nên sử dụng các kháng sinh Fluoroquinolon ở bệnh nhân có nguy cơ cao gặp biến cố bất lợi trừ khi không có biện pháp điều trị thay thế	- Bệnh nhân tắc nghẽn hoặc phình động mạch chủ hoặc các mạch máu khác; - Tăng huyết áp; - Các rối loạn gen liên quan đến thay đổi mạch máu; - Người cao tuổi.	Nguy cơ đứt và tách thành động mạch chủ tăng lên trên 2 lần.

Các khoa lâm sàng theo dõi, phát hiện, xử trí các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của các thuốc nêu trên (nếu có) và gửi báo cáo phản ứng có hại của thuốc về Khoa Dược theo mẫu báo cáo phản ứng có hại của thuốc được ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011. Khoa Dược sẽ tổng hợp các báo cáo để gửi về Trung tâm quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc hoặc Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc Tp. Hồ Chí Minh.

Vì tính an toàn khi sử dụng thuốc, đơn vị Thông tin thuốc – Dược lâm sàng thông tin để các khoa lâm sàng lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc./.

TỔ TTT - DLS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KD.